# Exemple de parodontite candidosique.

Patiente 50 ans, voit son dentiste tous les ans. Bonne hygiène mais comme à ressentir du «déchaussement».

Elle s'en ouvre au praticien qui lui conseille classiquement de bien se brosser les dents ...

En désespoir de cause elle vient consulter à mon cabinet .

En date du 15/01/2017 on constate.

- 1/ Début de lyse osseuse en regard principalement des dents supérieures., Petites lyses à la mandibule.
- 2/ Au microscope présence de bactérie motiles en petit nombre.
- 3/ A l'analyse bactériologique on a la confirmation que la flore bactérienne est peu pathogène ( ci dessous gélose au sang qui montre peu de bactéries pathogènes)-



La gélose de Drigalski elle est totalement indemne de germes gram -



Or la patiente présente tous les signes cliniques d'une parodontite chronique. C'est la gélose CAN II spécifique du candida albicans sous forme mycélienne qui va faire le diagnostic : parodontite candidosique.

A noter que le candida ne se voit pas au microscope à contraste de phase seule la bactériologie peut établir la présence de candida albicans dans les poches parodontales.



L'étiologie de la parodontite candidosique est liée à de nombreux facteurs :

En tout premier lieu le STRESS Les médicaments chimiques L'alimentation sucrée (Sucres rapides mais aussi sucres lents) L'alimentation galactée (lait et produits laitiers) Le candida albicans est présents dans toutes les bouches sous forme de levures saprophytes, nourritures de certaines bactéries comme le streptococcus mutans.

Il va sous l'influence toujours des mêmes causes citées plus haut muter génétiquement en un mycelium fortement pathogène et allergisant. Il est susceptible de libérer des toxines comme la canditine neurotoxique.

La clinique est frustre. Signes de parodontite en bouche . Au niveau digestif on peut noter des ballonnements parfois douleurs épigastriques avec une forte appétence pour le sucre.

Le traitement proposé est le suivant :

Pour le stress Fleurs de Bach spécifiques de la patiente, puis traitement suivant : 1/ Brossage bi-quotiden avec un mélange de bicarbonate de Na (poudre extra fine) et peroxyde d'hydrogène goménolé à 6/1000.(exemple d'ordonnance en annexe)

- 2/ Rincage avec Calendula en TM 10 à 20 gouttes dans un peu d'eau.
- 3/ Traitement au laser de puissance Nd:YAP. (photo en annexe)
- 4/ Traitement à la Milta (ou Rikta)



5/ Une séance de SWD avec SPOOKY 2 en fréquence CANDIDA ALBICANS 1 avec création d'une formule informée sur Silicium 7 .Prise de 10 gouttes par jour durant le traitement.

Résultats thérapeutique, 1/ Stabilisation en 1,5 mois de la parodontite chronique.

- 2/ Disparition bactériologique des colonies de candida.
- 3/ Signes cliniques associés ont disparus.

Le traitement est continué pendant 5 mois, puis des contrôles seront effectués tous les 6 mois.

## **ANNEXES**

- Cabinet dentaire
- Route de Moiry 7
- CH-1148 MONT LA VILLE Email: biodent.sam@gmail.com

## **Docteur Samuel Debard**

#### Médecin-Dentiste

Prescription antiseptique pour un traitement parodontal pour M.

#### Produits a commander en pharmaci

1. Eau oxygénée  $(H_2O_2)$  5 vol (1.5%)goménolée à

6 pour 1000 (pour mille) avec du Disper.

Goménol = (HE Niaouli d'Australie ou Nelle Calédonie)

- 2. Bicarbonate de sodium (poudre fine)
- 3. Solutions de rinçages :
  - Eludril ou Curasept: a utiliser pendant les 15 premiers jours du traitement..
  - ii. Calendula en TM pour la suite du traitement
- Brosses à dent : Oral B cross action 2,
  Méridol paro (à utiliser après les soins laser) ou Trisa sonic power (Fortement recommandée)
- Dentifrices: Dentifrice au calendula ou au rathania de Weleda ou dentifrice Méridol..
- Traitement anti-infectieux :PYROGENIUM en 5CH Sucer 5 granules deux fois par jour pendant 10 jours.

#### Méthode d'utilisation

#### Matins et soirs

- Après obtention d'une pâte consistance fluide, brosser les gencives, les dents et la langue avec la brosse (OralB Cross Action. si vous la trouvez ou la nouvelle brosse Sonic power de Trisa) comme recommandé sur votre notice
   « Conseils à propos de votre hygiène bucco dentaire ».
  - Ne pas rincer votre bouche avec de l'eau pure après l'application de cette pâte, mais avec le bain de bouche. (point 3)
- 2 Puis faire un bain de bouche avec d'abord Eludril pendant 15 jours puis comme le produit pourrait jaunir les dents, après 15 hjours utiliser à la place Calendula en TM 20 gouttes dans un verre d'eau à la suite du brossage afin de rincer la bouche.
- 3 Utiliser\_pour l'après-repas de midi un dentifrice classique.(Point 5)

Docteur Samuel Debard

Attention, la pâte dentifrice et le bain de bouche (point 1 , 2 et 3) seront ensuite utilisés au minimum 1 fois par jour, a vie.

N.B.: Vous pourrez également mélanger un peu de poudre de bicarbonate, quelques gouttes d'eau oxygénée et du dentifrice Méridol. L'action thérapeutique est excellente.



