

Hier erfahren Sie mehr:
www.lass-dich-impfen.ch

Impfplan 2026

adaptiert nach dem Bundesamt für Gesundheit*

	11 - 14/15 Jahre	25 Jahre	45 Jahre	ab 65 Jahren
Diphtherie	○	○[a]	○[a]	○[a]
Starrkrampf (Tetanus)	○	○[a]	○[a]	○[a]
Keuchhusten (Pertussis)	○	○[b]	◌[b]	◌[b]
Kinderlähmung (Polio)	●[c]	●	●	●
Hepatitis B	○○ / ○○○[d]	●●●	●●●	●●●
Meningokokken B	○○[e]			
Meningokokken ACWY	○[e]			
Masern, Mumps und Röteln	●●[f]	●●[f]	●●[f]	
Windpocken (Varizellen)	●●[g]	●●[g]	●●[h]	
Gürtelrose (Herpes Zoster)		◌◌[i]	◌◌[i]	○○
Humane Papillomaviren (HPV)	○○ / ●●●[j]	○○○		
Pneumokokken				○[k]
Grippe (Influenza)	◌[l]	◌[l]	◌[l]	○[l]
COVID-19	◌[m,**]	◌[**]	◌[**]	○[**]
Respiratorisches Synzytial Virus (RSV)		n	n	○[o, §]
Zecken-Enzephalitis (FSME)	◌◌◌[p,**]	◌◌◌[p,**]	◌◌◌[p,**]	◌◌◌[p,**]

○ Basisimpfung / Ergänzende Impfung ● Nachholimpfung, falls angezeigt (Impfstatus kontrollieren) ◌ Empfohlene Impfung für Risikogruppen oder -Situationen (siehe unten)

1 Punkt = 1 Impfdosis ⬚ Kombinationsimpfung

a: Zwischen 25–64 Jahren werden dT-Auffrischimpfungen im Intervall von 20 Jahren empfohlen, ab 65 Jahren im Intervall von 10 Jahren. Dabei bestimmt das Alter bei Verabreichung einer Auffrischimpfung das Intervall zur nächsten Auffrischimpfung. Kürzere Intervalle können je nach Risikosituation indiziert sein.** **b:** 1 Dosis: für alle Personen mit 25 Jahren sowie unabhängig vom Alter bei regelmässigem Kontakt mit Säuglingen < 6 Monate (letzte Dosis vor ≥ 10 Jahren) und für schwangere Frauen in jeder Schwangerschaft (unabhängig vom Impfstatus).** **c:** Vollständige Polio-Impfung im Kindesalter: Total 4 Dosen, 2 davon ausserhalb des ersten Lebensjahres. Wurden 3 Dosen innerhalb des ersten Lebensjahrs verabreicht («3+1»-Impfschema), sind total 5 Impfdosen im Kindesalter nötig. **d:** Wenn nicht im Säuglingsalter geimpft, soll die HBV-Impfung möglichst im Alter 11–15 Jahre erfolgen, sie ist in diesem Altersfenster mit einem 2-Dosen-Schema («Erwachsenen-Impfstoff») oder 3 Dosen-Schema (Kinderdosierung) möglich. **e:** Nachholimpfung bis zum 20. Geburtstag empfohlen. Nachholimpfungen gegen Meningokokken B und ACWY können gleichzeitig verabreicht werden. **f:** Alle unvollständig oder ungeimpften Kinder, Jugendliche sowie nach 1963 geborene Erwachsene benötigen insgesamt 2 Dosen. **g:** Für Personen bis zum Alter < 40 Jahren, welche die Varizellen anamnestisch nicht durchgemacht haben und die bisher keine oder nur 1 Impfdosis erhalten haben (insgesamt 2 Dosen). Bei unvollständigem Impfschutz gegen Masern, Mumps und Röteln kann die Impfung auch mit einem kombinierten, quadrivalenten MMRV-Impfstoff und mit anderen gleichzeitig empfohlenen Impfungen erfolgen. **h:** Für nicht-immune Personen ab 40 Jahren kann in bestimmten Risikosituationen eine Varizellen-Impfung empfohlen sein. **i:** Aktuelle Risikoempfehlung: ≥ 50 Jahre: Empfohlen für alle Personen mit aktueller oder zukünftiger (insbesondere zellulärer) Immunschwäche. ≥ 18 Jahren: Empfohlen für Personen, die derzeit an einer schweren Immunschwäche leiden oder die aktuell bzw. in absehbarer Zeit eine immunsuppressive Behandlung erhalten.** **j:** Im Alter von 11-14 Jahren gilt ein 2-Dosen-Schema und mit 15-26 Jahren ein 3-Dosen-Schema. **k:** Für Personen ≥ 65 Jahre, welche PCV-ungeimpft sind oder nur mit PCV13 (vor ≥ 1 Jahr) geimpft wurden: eine einmalige Impfdosis mit PCV20 oder PCV21. Falls bereits PCV15-geimpft (vor ≥ 1 Jahr): einmalige Dosis mit PCV21. **l:** Schwangere Frauen (jede Schwangerschaft während Grippesaison)**; Influenza: ab 65 Jahren (jährlich) als ergänzende Impfung; für alle ≥ 75-Jährigen sowie Personen im Alter ≥ 65 Jahren mit zusätzlichem Risikofaktor ist ein Hochdosis-Grippeimpfstoff vorzuziehen. **m:** Für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 15 Jahren mit schwerer Immundefizienz empfohlen. Anzahl Dosen gemäss Produkte-Fachinformationen bzw. aktuellen Empfehlungen im Impfplan 2026 des BAG/EKIF.** **n:** Schwangeren Frauen ab dem Alter von 18 Jahren wird 1 Dosis des in der Schwangerschaft zugelassenen RSV-Impfstoffs einmalig für die Schwangerschaftswoche 32 bis 36 empfohlen, bei errechnetem Geburtstermin zwischen Anfang Oktober und Ende März. **o:** Personen im Alter zwischen 60 und 74 Jahren mit einem erhöhten Risiko für eine schwere RSV-Erkrankung mit relevanten Grunderkrankungen sowie als ergänzende Impfung für alle Personen ab 75 Jahren.** **p:** Grundimmunisierung: 3 Dosen, danach wird alle 10 Jahre eine Auffrischimpfung empfohlen.**

* Adaptierte Darstellung der Angaben mit Relevanz für Erkrankungen ab 11 Jahren aus: Bundesamt für Gesundheit (BAG), Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) Schweizerischer Impfplan 2026.

** Empfohlene Impfung der Kategorie Risikogruppen/Risikosituationen gemäss BAG Impfplan 2026.
Zusätzlich gibt es weitere separate Impfempfehlungen und Informationen beispielsweise für Reisende, schwangere Frauen, Risikogruppen und/oder deren enge Kontaktpersonen.

§ Keine Kostenübernahme durch die obligatorische Krankenversicherung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin/ Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin/ Ihren Apotheker.

NP-CH-AVU-PSTR-250006-02/2026

GlaxoSmithKline AG, Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar
©2026 GSK group of companies or its licensor.

GSK